

FLORE DE L'ILE DE LESBOS, par **M. Paléologos CANDARGY** (1).

- Rhamnus tinctoria* W. K. — In parte boreali insulæ culta, ex Asia minore introducta.
- R. prunifolia* Sibth. et Sm. — Spontanea in monte Hermotyliæ seu Ἑρμοῦ πύλας ad pagum Philia.
- Vitis vinifera* L. — Spontanea ad rivulos, sepes; vulgo ἄγριον κλῆμα. — C.
- Pistacia* (affinis *veræ*?). — Nosco solum foliis deciduis glabris imparipennatis 1-2 jugis vel simplicibus, foliolis ovatis vel ovato-oblongis obtusis vel acutis. Arbuscula habitat alt. 0-640 m. — CC.
- Rhus Coriaria* L. — Reg. mont. Lepetymniæ Olympiæque.
- Euphorbia Chamæsyce* L. β. **exappendiculata**. — Foliis parvis vel minutissimis ovatis vel rotundatis, involucris hirtis fauce ciliatis, lobis ovatis hirtis, glandula transversa concava apice membrana angustissima vel nulla.
- E. Cham* γ. **grandifolia**. — Minus hirtum, folia majora et remotiora.
- E. pilosa* L. forma involucri glabro. — RR.
- E. exigua* L. **var.** — Bracteolis obsoletis, involucris lobis integris ovato-triangularibus, capsula ovato-globosa. — C.
- E. falcata* L. **var. rubra** (Cav.) Boiss. — Inter Megali et Micra Limni.
- E. falcata* L. **var. æolica** (aff. *rubræ* (Boiss.) Cav.). — Albo-rubens, capsulæ ovato-oblongæ pedicellus longus seminibus 4-gonis 5-8 sulcatis vel sulcis ad foveolas reductis, caruncula brevis; folia floralia ovato-rotundata vel rarius modice transverse latiora, obtusissima ad laterem ciliis aucta. — In Petakas, Gaidarantiphoros.
- E. Peplus* L. **var. maritima** Boiss. — Littore ad Mitylenem.
- — **acerata**. — Planta minor foliis floralibus ovato-rhombeis basi latioribus apice acutis, glandulis transversis latioribus, cornubus obsoletis vel nullis, capsulæ coccis dorso sulcatis, sulcis margine alato-bicarinatis, seminibus obtuse hexagonis, caruncula depressa conica postice sulcata. — Loco Vats ad Mandamados.
- E. Ledebourii* Boiss. **var. insularis**. — 3/5/90 littore Nerutsica legimus. Foliis infimis ovato-oblongis obtusis, superioribus lineari-spathulatis obtusis, umbellæ radiis bi-trifidis, foliis umbellaribus longioribus truncato-apiculatis, floralibus linearibus acutis basi latioribus, involucris minimi turbinati sanguinei lobis ovatis ciliatis, glandulæ transverse latiores concolores, capsulæ coccis apice

(1) Voy. le Bulletin, plus haut, p. 108.

minute granulosis, semine ovato haud quadrangulo lacunoso reticulato, caruncula minuta conica sulcata.

Euphorbia græca Boiss. et Spr. var. **brachyceras**. — Capsula minute trisulcata, sed seminibus brunneis, glandularum cornubus brevibus. Habitat in loco Stratonicos dicto regionis inferioris Maleæ.

E. Paralias L. — Littoribus Argala, Kampos, Sigrion Eressi.

E. Characias L. — Larissa, Gephyrelia Keramnia fluvius Nethron (Νέθρων) usque ad Karini et ejus montibus in saxis nec non in Plati 140 cm. ad pagum Scuda et in montis Olympi Kampia locum ascendens.

Andrachne telephioides L. — In colle Vunarion, 40 cm. ad Mitylenem, legimus 24/7 1887. — RR.

Callitriche pedunculata DC. — Fluvio Ligionas Jeræ, aquis stagnantibus Achladia Mandamadi. Fructus longe pedunculatus.

Saxifraga tridactylites L. — Petrovuni. — RR.

Umbilicus serratus (L.) DC. — Udja. — RR.

Sedum altissimum Poir. var. **albiflorum**? — CC.

S. amplexicaule DC. — Pedes Olympi et in Petrovuni, 800 m.

S. eriocarpum Fl. Gr. — Olympus, Petrovuni, Svirni.

S. confertiflorum Boiss. — Udja.

S. cæspitosum Cav. — RR.

Cornus mas L. — Reg. Olympia.

Bupleurum trichopodon Boiss. et Heldr. **forma**. — Caule flexuoso erecto dichotome ramoso, involucre 1-2 phyllo, phyllo altero minore rarissime phyllis nullis pedicellis fructu æquilongis vel brevioribus, involucri phyllis fructu brevioribus vel æquilongis aut longioribus. — Reg. mont. et inf. — C.

Helosciadium nodiflorum L. **forma minor**. — Omnibus partibus minor. In humidis. — C.

Microsciadium tenuiflorum Boiss. — Lapidosis Petrovuni.

Pimpinella peregrina L. — Campo Eressio, etc.

Crithmum maritimum L. — Maritimis saxis calc., etc. — C.

Condylocarpus apulus (L.) Hoffm. var. **macropapillus**. — Fructus papillis elongatis. Littus Thermni.

Daucus Carotta L. — R.

Torilis infesta L. — Buro Olympi. — R.

T. neglecta R. et Sch. — Gephyrelia (Ipios), fluvio Vuchyla (Gelia). — R.

Physocaulus nodosus Tausch. — Reg. Olympiæ.

- Scandix Pecten-Veneris* L. forma **montana**, omnibus partibus minor.
— Olympus Petrovuni.
- S. Pecten-Veneris* var. *brevirostris* Boiss. — Malea. — C.
- S. pinnatifida* Vent. — Reg. mont. Maleæ et in regione Olympiæ usque ad summum Olympi. — C.
- S. australis* L. — Agriorrhodia, Olympos, Oros, Andria, Bambacæ ad Mandamados.
- S. grandiflora* L. — Amali mons.
- S. grandiflora* var. *lasiactina* Boiss. — Valle Hagios Spyridon.
- Smyrnum rotundifolium* Mill.
- Conium maculatum* L. — Campo Kalloni, Karkavura ad fluv. Hagios Dimitrios.
- Hippomarathrum cristatum* DC. — Reg. inf. et maritima Lepetymnia, usque ad Moriam et in Sigrion Eressi.
- Hedera Helix* L. — Reg. Olympia. Lepetymnia-Campo Ipios; vulgo *υισσός*, *λισσός* vel *ούτσός*.
- Epilobium lanceolatum* Sebast. — Reg. Olympia et Lepetymnia.
- Myrtus communis* L. var. **melanocarpa**. — Baccis nigris. Reg. inf. et mont. — CC.
- M. communis* var. **leucocarpa**. — Baccis albis, subrara.
- Punica Granatum* L. — Subspont. in Acothi Maleæ.
- Cydonia vulgaris* Pers. — Spontanea in Messaca ad fluvium Lygionas campi Jeræ et in Hagii onargyri ad Mesotopos.
- Pirus amygdaliformis* Vill. — In reg. inf. et submont. — CC.
- P. elæagrifolia* Pall. — Reg. inf. — C.
- Cratægus monogyna* Jacq. — Reg. inf. et mont. usque in summis Olympi. — C.
- Cratægus spec.* (n° 2299 herb.). — In Malathra (Moni Limonos).
- Rosa canina* L. var. **lutetiana** Lamk. — In Campo Ipios, ad ostium fluvii Kalamniari.
- R. dumetorum* Thuill. form. **suborthacantha**. — Aculeis rectis vel paulo subovatis, folia supra et subtus parvissime adpresse puberula fere glabrescentia, flores pedunculati 1-3 sed sæpe solitarii, pedunculi receptacula et sepala dorso nuda. Foliola elliptica majora 3-3 1/2 cm. longa, in Liacas, Buro Olympi et circa, Mirivili.
- R. tomentella* Léman, forma **æolica**. — Foliis glanduloso-biserratis, ovatis, pedunculis solitariis, urceolis et sepalorum pauci-laciniatorum dorso setoso-hispidis, stylis parce pilosis, caulium aculeis validis dispersis geminatisque, foliorum petiolo glanduloso aculeatoque. — Mons Olympos 700 m.; pro Asia minore nova.
- R. sempervirens* L. — Spontanea in Campo Ipios.

Rubus tomentosus Borkh. — Reg. mont Olympiæ. — CC.

— — β . *glabratus* Gml. — Pedes Olympi, Liacas.

Potentilla Fragariastrum β . **rhytidocarpa**. — Villosa rhizomate exstolonifero, caulibus brevissimis paucifloris foliis radicalibus multo brevioribus, foliolis brevipetiolatis subtus glaucis non dense hirsutis ovatis grosse serrato-crenatis, foliis caulinis ternatis, calycis laciniis lanceolatis acutis subæqualibus, petalis siccis calyce brevioribus albis, achænia reticulato-rugosa (in speciminibus helveticis typi læves sunt). — Reg. mont. Bum ta Kaminia, valle Andria.

P. hirta L. *pedata* Koch, sed foliis non distincte pedatis. — In reg. Olympia. — C.

Agrimonia Eupatoria L. — Reg. mont Olympiæ.

A. Eupatoria β . *græca* (Boiss. et Heldr.) Boiss. — Ibidem.

Poterium muricatum Spach. — Buro (Olympos) et circa.

Amygdalus Webbii Spach. — In montibus, Oxia petra, Melissorachto.

Cerasus prostrata (Labill.) Loisel. — Summis Olympi et Lepetymni rupes tegens, prostratus. Vulgo $\pi\sigma\pi\iota\lambda\acute{\iota}\alpha$ seu Mespilus. — C.

Prunus spinosa L. *fruticosa* Weih. — Vulgo $\acute{\alpha}\rho\kappa\omicron\mu\eta\lambda\acute{\epsilon}\alpha$. In reg. mont. Olympiæ et Lepetymniæ communis, præsertim in montibus Olympos et Lepetymnon.

P. insititia L. — Spont. in Pirgi Thermni.

P. domestica L. — Flambro (Maleæ, Melissorachto, Scotino-vuno).

Lupinus hirsutus L. — Aulona, circa Asomatos.

Adenocarpus divaricatus L'Hér. *græcus* Boiss. — Vulgo $\sigma\mu\acute{\upsilon}\rho\eta\eta$. Monte Asomatos (Mesotopos), collibus Omala (Mesotopos).

Genista acanthoclada DC. — In pinetis Pencôn ad Lapmyli.

G. anatolica Boiss. — In pinetis Pencôn, rara in Malea ad pagos Chalici. — CC.

Cytisus candicans L. — In valle Andria, monte Palæocastron. — C.

Calycotome villosa Vahl **macrocarpa**. — Leguminibus linearibus ad Kilia.

Ononis spinosa L.

O. leiosperma form. **remota**. — Spinis remotis non crebris, foliis oblongis circa Mitylenem.

Medicago falcata L. — Inter Vassilikiotis et Micra Limni.

M. falcata prostrata (Bess.) Boiss. — Ad Mitylenem et in colle Lithacas Ordymni.

M. media Pers.

M. elegans Jacq.

- M. cylindrica* DC. var. **puberula**. — Legumen puberulum glandulosum majus, foliis pedunculo paulo majoribus.
- M. lenticulata* Willd. var. **genuina** Boiss.
- M. pentacycla* DC.
- M. apiculata* Willd.
- M. laciniata* All. β . **brevidenticulata**. — Pedunculis brevibus folio brevioribus vel subæquilongis, legumine facie hirtulo 7 mm. longo. — Pro Anatolia nova. — C.
- M. ciliaris* Willd. — In Kakopetria. — R.
- Trigonella azurea* C.-A. Mey. — In loco Meronia montis Oros.
- T. cærulea* L. — Ad Mityl. — RR.
- T. smyrnæa* Boiss. **scorpioides**. — Stipulis minimis, legumina 2-5 sperma, rostro adunco, calyce corolla 2-plo brevior, pedunculis 3-4 floribus. — Summa montis Oros.
- T. Spruneriana* Boiss. — Petrovuni, Kilia campi Jeræ.
- T. Spruneriana* β . **glabra**. — Tota planta glaberrima, flores..., stipulæ integræ rarissime unidentatæ, semina oblonga nigrescenti et minute maculata, in typo tamen concoloria haud maculata. — In summa montis Oros Jeræ.
- T. stellata* Forsk. f. α . **trichocarpa**. — Pedunculis nullis umbellis sessilibus, stipulis integris, corolla..., legumine subcompresso tincto nervis obliquis integris vel anastomosantibus, polyspermo seminibus ovato-oblongis quadratis, etc. — CC.
- T. stellata* f. β . **leiocarpa**. — Leguminibus glabris compressis.
- T. spicata* Smith (= *T. uncinata* Sev.). — In Petrovuni (Olympiæ), Chalaca (Maleæ). — R.
- Pocockia cretica* (L.). — In Nicæa ad Zossa Jeræ regione mont. — R.
- Melilotus sulcata* Desf. β . **major**. — Stipulis omnibus ciliato-dentatis, foliolis superioribus angustioribus, leguminibus *obtusè carinatis* vel fere *sulcatis*, rugis subliberis, pedicellis calyci florifero æquilongis, caule non procero, racemis fructiferis densis. — In campo Jeræ.
- M. italica* L. — In Lincus. — R.
- M. neapolitana* Ten. — In reg. mont. Olympiæ.
- Trifolium Preslianum* Boiss. — Reg. Olympiæ et Lepetymniæ.
- T. angustifolium* L. **pilosum**. — Laciniis calycinis apice pilosis haud nudis (ut in typo capitulis oblongo cylindricis). — In littore Thermni.
- T. purpureum* Loisel. — In reg. Olympia et Lepetymnia. — C.
- T. pallidum* W. K. — Reg. Olympia inferior.

Trifolium alexandrinum L. — RR.

T. panormitanum L.

T. reclinatum W. K. — Ad pagum Mistigna.

T. maritimum Huds. — RR.

T. dalmaticum Vis.

T. Bocconi Savi form. **tenuifolia**. — Foliolis superioribus oblongo-linearibus. In Campo Jeræ. — R.

T. Petrisavii **fistulosum**. — Caule fistuloso ut in *T. Meneghiniano*. — R.

T. Meneghinianum Clem.

Lotus cytisoides L. — Kacopetria, Hagii Acinadini.

L. corniculatus L. var. **lesbiacus**. — Glaber caulibus procumbentibus vel ascendentibus elongatis, foliis floribusque majoribus, foliolis obovato-oblongis, acutis vel sublinearibus obovato-oblongis, bracteis 3-4 inæqualibus calyce brevioribus longioribusque acutis, calycis laciniis tubo longioribus. — Campo Ipios.

L. tenuifolius Rchb. — Campo Messa.

L. lamprocarpus Boiss. — Foliolis ovatis vel oblongis. Fluvio Vuchyla Lepetyzni, in Karini. — R.

L. angustissimus L. β . **brachypodus**. — Pedunculo folio multo brevior, legumine paulo longiore, filamentis biformibus. — In pinetis Pencôn dictis, in Micra-Limni.

Tetragonolobus purpureus Mnch. — R.

Anthyllis Vulneraria L. var. *rubriflora*? Boiss. (*A. Dillenii* Schult.). — Reg. mont. Olympiæ et Maleæ.

Galega officinalis L.

G. bicolor Hausskn. — Deest in insula Lesbos, vidi in Asia minore prope pago Ajusmati.

Astragalus Pseudostella Del. — In Massaka et Kilia Jeræ.

A. pentaglottis L. — Reg. inf. et mont.

A. hamosus L. — Reg. inf. et mont.

A. angustifolius L. var. *genuinus* Boiss. — In Olympo 1110-1180 m. — CC.

Scorpiurus sulcata L. — Colle Pettacas (seu possessio philosophi Pittaci) ad Mitylenem.

Coronilla parviflora **rubriflora**. — R.

C. parviflora **albiflora**. — R.

Onobrychis Caput-galli L.

Vicia pannonica Jacq.

- V. cuspidata* Boiss. — In reg. inf. sed præ. montana. — C.
V. peregrina typica.
V. peregrina tricuspida. — Folia anguste linearia, apice tricuspida, vel inferiora latius linearia, stipulis angustis fere semper integris, legumina immatura oblonga 3 1/2 cm. longa, 1 cm. lata.
V. peregrina brachycarpa. — Stipulis integris, foliolis anguste linearibus acutis, leguminibus oblongis, floribus violaceis.
V. narbonensis L. — R.
V. cracca L. β . **villosula**. — Legumine..., planta pubescenti-villosula, caulibus \sphericalangle erectis, vexilli lamina ungue subduplo longiore, foliola inferiora elongata late linearia superiora tenuiter linearia, inflorescentia foliis æquilonga vel subæquilonga. — Mons Petrovuni.
V. tenuifolia Roth β . **stenophylla** Boiss. — Reg. Olympia. — C.
V. bithynica L. — R.
V. salaminia Hldr. et Sart. subspec. **macrophyllaria**. — Foliolis obtusiusculis oblongo-lanceolatis.
Ervum nigricans MB. — Mons Amali. — R.
E. Lenticula Schrb. form. **macropoda**. — Pedunculis folio 2-plo longioribus, in monte Petrovuni, Phterygia ke Sbyrni. — R.
Lathyrus Ochrus L. — Spont. — R.
L. Clymenum L. — R.
L. Cicera L. **hirtulus**. — Præsertim inferne \pm patule hirtula, legumine margine superiore distincte sulcato; cætera typi. — C.
Pisum arvense L. — Spontaneum in herbidis, Miribili 600 m., Liacas, etc. — R.

PLANTES PLUS OU MOINS COMMUNES DANS L'ILE DE LESBOS.

Ceterach officinarum, Polypodium vulgare, Cheilanthes fragrans, Adiantum Capillus-Veneris, Pteris aquilina (in regione montana), Nephrodium rigidum Desv. β . australe Ten. (in reg. mont.), Equisetum ramosum Schl., Selaginella denticulata (reg. inf.).

Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm. (in collibus saxosis usque ad 560 m.), J. excelsa MB. (ad 450 m.), J. phœnicea, Cupressus sempervirens (cult), Pinus halepensis (silvas formans), Ephedra campyloclada C. A. M. (in saxosis regionis inferioris).

Posidonia oceanica Del., Lemna minor.

Arisarum vulgare Targ., Arum italicum, Dracunculus vulgaris Schott.

Typha angustifolia.

Digitaria sanguinalis, Setaria viridis, S. verticillata, Imperata cylindrica, Erianthus strictus Boiss. (typicus), Pollinia distachya Spr., Anthoxanthum

odoratum, Phalaris brachystachys, Ph. minor *Retz* (variat spica ovata), Ph. paradoxa, P. nodosa, Phleum tenue, Ph. græcum *Boiss. et Hldr.*, Aristella bromoides *Bertol.*, Piptatherum miliaceum, P. cærulescens, Gastridium lendigerum, Polypogon monspeliensis, P. maritimus *Willd.*, Lagurus ovatus, Aira capillaris (colles usque ad reg. mont.), Avena sterilis, Avena barbata, Gaudinia fragilis, Arrhenatherum elatius β . palæstinum *Boiss.* (reg. inf. et montana), Cynodon Dactylon, Phragmites communis, Arundo Donax (in flum., rivulis et culta), Echinaria capitata (collibus), Cynosurus echinatus (reg. inf. et mont.), C. elegans, Kœleria phleoides, Eragrostis megastachya *Lmk.*, Melica ramosa *Vill. var. vulgaris Cosson*, M. ciliata, Briza spicata (reg. inf. et sup. Maleæ et Olympiæ), B. maxima, Æluropus littoralis, Dactylis glomerata, Poa annua, P. pratensis (reg. inf. et ad 500 m.), P. bulbosa (plerumque vivipara, in collibus), Vulpia ciliata *Link.*, Catapodium loliaceum *Link.*, Scleropa rigida (0-700 m.), Bromus tectorum (reg. super. et inf.), Bromus madritensis, B. fasciculatus *Presl* (reg. inf. et sup.), B. mollis, B. arvensis, B. patulus (reg. inf. sup.), Brachypodium distachyum, B. pinnatum (in Malea), Triticum villosum (0-500 m.), Ægilops ovata, Æ. ovata triaristata, Æ. triuncialis, Æ. caudata (in regionibus Maleæ Olympiæque), Lolium rigidum (reg. inf. et sup.), L. lepturoides *Boiss.* (idem), L. temulentum, Lepturus incurvatus (littor.), Psilurus nardoides (reg. inf. sup.), Hordeum distichum (cultura), H. vulgare (id.), H. hexastichum (id.), H. murinum, H. maritimum (C. in littoribus, in interioribus rarum : colle Udja, Malacopetra, ad lacum Megali-Limni), H. bulbosum, Elymus Caput-Medusæ.

Carex divisa, C. serrulata *Biv.*, Heleocharis palustris, Isolepis tenuis *Presl.*, Scirpus maritimus, Cyperus longus.

Luzula græca *J. et Sp.* (200-700 m.), Juncus acutus, J. ponticus *Stev.*, J. maritimus.

Ornithogalum narbonense, Urginea maritima, Scilla autumnalis, Allium Ampeloprasum, A. paniculatum, A. pallens *Parl.*, A. Cupani *Raf.*, A. Chamæmoly, A. subhirsutum, A. trifoliatum *Cyrill.* roseum, A. trif. albiflorum, A. roseum, A. nigrum, Muscari comosum (vulgo λύρα), M. racemosum, M. neglectum *Guss.*, M. commutatum *Guss.*, Bellevalia ciliata *Nees*, B. trifoliata *Kth.*, Lloydia græca *Endl.*, Gagea foliosa *R. et Sch.*, Asphodelus racemosus.

Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus, Tamnus creticus, Crocus sativus var. Pallasii *G. Maw* (C. in reg. montana), Romulea Bulbocodium, Iris Sisyrynchium, I. troyana *Asch.*, Hermodactylus tuberosus *Salisb.*, Gladiolus segetum, Sternbergia lutea (L.) *Gawl.*, Narcissus Tazzeta var. typicus *Boiss.*

Serapias laxiflora *Chaub.*, Orchis Morio, O. coriophora, O. coriophora fragrans *Boiss.*, O. tridentata *Scop.*, O. longicruris *Link.*, O. quadripunctata *Cyr.*, Ophrys fusca, O. lutea, O. tenthredinifera, O. arachnites, O. aranifera *Huds. forma*, O. Bertolonii (labello indiviso), Epipactis latifolia, Spiranthes autumnalis.

Alisma Plantago.

Juglans regia (cultura), Quercus sessiliflora *Sm. var. pinnatifida Boiss.* (reg. inf. et mont.), Q. sessil. form. pubescens *Boiss.*, Q. coccifera L. α . genuina *Boiss.*, Q. calliprinos *Webb var. inops Kny* (AC.), Salix fragilis, Platanus orientalis.

Ulmus campestris, *Celtis australis*, *Ficus Carica*, *Urtica urens*, *U. pilulifera*, *U. dioica*, *Parietaria lusitanica*, *P. diffusa*.

Cynocrambe prostrata *Gærtn.*, *Salicornia herbacea*, *S. fruticosa*, *Atriplex hastata*, *A. græca* *Fl. Gr.*, *Obione portulacoides*, *Beta maritima*, *B. trigyna*, *Chenopodium Vulvaria*, *C. album*, *C. murale*, *C. Botrys*, *Salsola Tragus* *MB.*, *S. Soda*.

Albersia Blitum *Kth*, *A. deflexa*, *Amarantus albus*, *A. silvestris*, *A. retroflexus*.

Rumex obtusifolius, *R. tuberosus*, *Polygonum Convolvulus*, *P. aviculare et var. erecta* *Roth*, *P. maritimum*.

Laurus nobilis, *Thymelæa argentea* *Fl. Gr.* (reg. Malea), *Osyris alba*, *Thesium humile* *Vahl*, *Aristolochia hirta*, *Cytinus Hypocistis*.

Valerianella echinata (reg. inf. et sup.), *V. Soyeri* *Buch.* (id.), *V. truncata* *Rchb.* (id.), *V. coronata* (id.), *V. obtusiloba* *Boiss.* (id.), *Centranthus Calcitrapa* (lapid. regionis inf. et mont.), *Valeriana Dioscoridis*.

Scabiosa sicula (reg. inf. sup. saxis), *Callistemma brachyatum* *Sibth.*, *Pteroccephalus plumosus* *Coult.*

Erigeron canadensis, *Bellis silvestris*, *Evax pygmæa*, *Inula candida*, *Cupularia graveolens*, *C. viscosa*, *Pulicaria dysenterica var. microcephala* *Boiss.*, *Pallenis spinosa*, *Cota truncata* (P. Cand. in *Rev. méd. pharm. Constant.*), *Anthemis cretica*, *E. chia*, *A. tomentosa* (in aren. mar.), *Matricaria Chamomilla*, *Coleostephus Myconis*, *Chrysanthemum coronarium*, *Xanthophthalmum segetum* (variat foliis profundius fissis), *Phagnalon rupestre*, *Helichrysum angustifolium*, *Filago germanica et var. eriocephala* *Guss.*, *F. spathulata*, *F. arvensis*, *F. gallica*, *Senecio vulgaris*, *S. vernalis*, *Calendula arvensis*, *Cardopatum corymbosum*, *Carlina lanata*, *Chamæleon gummiferus*, *Atractylis cancellata* (reg. inf. ad 500 m.), *Carduus argenteus*, *C. pycnocephalus*, *C. nutans* (humidis silv. reg. montanæ), *Picnomon Acarna*, *Notobasis syriaca*, *Onopordon illyricum*, *Tyrimnus leucographus*, *Centaurea depressa* (reg. inf.), *C. solstitialis*, *C. iberica* *Trevir.*, *Crupina Crupinastrum*, *Kentrophyllum lanatum*, *Cnicus benedictus* *L. var. Kotschyi* *C. Bip.* (C. in reg. mont.), *Scolymus maculatus*, *Myscolus hispanicus*, *Catananche lutea*, *Cichorium divaricatum*, *Hyoseris scabra*, *Hedypnois cretica*, *Rhagadiolus stellatus* *DC. α. hebelænus* *Boiss.*, *Tolpis umbellata*, *T. altissima*, *Thrinicia tuberosa* *DC.*, *Picris parviflora*, *P. Sprengeriana*, *Urospermum picroides*, *Geropogon glaber*, *Tragopogon parvifolius*, *T. longirostris* *Bisch.*, *T. pratensis*, *Hypochoëris glabra*, *H. glabra β. heterocarpa* *Moris*, *Taraxacum gymnanthum*, *Chondrilla juncea*, *Sonchus oleraceus* (typicus), *S. asper*, *S. græcus* *Reut.* (= *S. glaucescens* *Jord.*), *Lactuca cretica*, *L. Scariola*, *S. saligna*, *Zacyntha verrucosa*, *Ætheorrhiza bulbosa*, *Crepis Sieberi* *Boiss.*, *C. parviflora* *Desf.*, *Barkhausia rubra*, *Lagoseris bifida* *Vis.*, *Rodigia commutata* *Spr.*

Xanthium spinosum.

Campanula Erinus, *Specularia Speculum et var. calycina* *A. DC.*, *S. pentagonia*, *S. falcata* *Ten.*

Vaillantia muralis, *V. hispida*, *Aspera muralis*, *Galium tricorne*, *G. verum*, *Rubia tinctorum*, *R. Olivieri* *Rich. et var. elliptica* *Boiss.*, *Asperula arvensis*

(reg. inf. et sup.), *Crucianella latifolia*, *C. macrostachya Boiss.*, *C. græca Boiss.*, *Sherardia arvensis*.

Sambucus nigra (spontanea et culta).

Olea europæa (spont. et culta), *Olea europ. var. Oleaster DC.*, *Phillyrea media*, *P. latifolia*.

Nerium Oleander (spont. et cult.. usque ad 500 m. ascendens).

Periploca græca, *Cynanchum acutum*, *Cionura erecta*.

Chlora perfoliata, *Erythræa spicata*, *E. Centaurium*, *E. maritima*.

Convolvulus pentapetaloides, *C. hirsutus*, *C. arvensis*, *C. tenuissimus Fl. Gr.*, *C. Scammonia*, *Calystegia sepium*.

Hyoscyamus albus, *Lycium europæum* (in littoribus), *Solanum nigrum*, *S. miniatum*.

Lavandula Stœchas, *Pulegium vulgare*, *Origanum vulgare var. prismatica Gaud.*, *O. hirtum Vogel*, *Majorana Onites*, *Thymus angustifolius* (reg. inf. et sup.), *Corydothymus capitatus Link et Hoffm.*, *Satureia Thymbra*, *Calamintha Clinopodium* (reg. inf. sup.), *C. graveolens* (reg. inf. sup.), *Melissa altissima Fl. Gr.*, *Salvia triloba*, *S. virgata*, *S. Horminium*, *Marrubium vulgare*, *Lamium amplexicaule*, *Stachys cretica*, *S. spinulosa Sibth. et Sm.*, *Ballota acetabulosa*, *B. nigra*, *Prasium majus*, *Ajuga chia*, *Teucrium spinosum*, *T. lucidum Sibth.* (= *T. divaricatum Sieb.*).

Verbena officinalis, *Vitex Agnus-castus* (variat colore : flore leucantho, roseo, violaceo, albo-violacea, albo-roseo, subroseo).

Anchusa hybrida Ten., *A. undulata*, *Echium plantagineum*, *Lithospermum arvense*, *Alkanna tinctoria*, *Myosotis idæa Boiss. et Heldr.* (200-600 m.), *M. hispida*, *Cynoglossum pictum*.

Verbascum plicatum Sibth. et Sm., *V. pycnostachyum Boiss. et Heldr.*, *V. sinuatum*, *Scrofularia peregrina*, *S. canina* (vulgo in pago gelia *στροφάρι*), *S. canina floribunda Boiss.*, *Linaria spuria*, *L. Elatine var. villosa Boiss.*, *L. græca Bory et Ch.*, *L. Pelliceriana*, *L. simplex*, *L. chalepensis*, *Antirrhinum Orontium*, *Veronica Anagallis*, *V. Beccabunga*, *V. arvensis*, *V. acinifolia*, *V. Buxbaumii Ten.*, *V. Cymbalaria*, *Euphrasia latifolia*, *E. viscosa*, *Trixago Apula*.

Acanthus mollis (C. ad Mitylenem).

Phelipæa ramosa β. Muteli Schultz, *Orobanche speciosa*.

Plantago major, *P. minor*, *P. lanceolata var. altissima*, *P. lanc. eriophylla Decsn.*, *P. lanc. capitata Presl*, *P. Bellardi*, *P. cretica*, *P. lagopus*, *P. lagopus var. major Boiss.*, *P. Coronopus et var. filiformis Koch*, *P. Psyllium*, *P. arenaria*.

Statice sinuata (in littor.), *S. Limonium*, *S. rorida Sibth. et Sm.*, *S. proliфера Urv.*, *Plumbago europæa*.

Cyclamen neapolitanum, *Asterolinum Linum-stellatum*, *Lysimachia atropurpurea*, *Anagallis arvensis*, *A. latifolia*, *Samolus Valerandi*.

Erica verticillata, *Arbutus Unedo*, *A. Andrachne*.

Clematis cirrosa, *C. balearica Rich.* (pro flora orientali nova), *C. balearica* × *cirrosa*, *Anemone coronaria*, *A. fulgens J. Gay*, *Adonis autumnalis*, *A. microcarpa DC.*, *Batrachium aquatile B. submersum Gr. et Godr.* (in paludibus),

Ranunculus chærophyllus, R. Sprunerianus *Boiss.*, R. ophioglossifolius *Vill.*, R. chius *DC.*, R. Philonotis *Retz.*, R. muricatus, R. arvensis, Ficaria calthæfolia *Jordan*, Delphinium Staphysagria, Pæonia peregrina β . glabra *Boiss.* (reg. mont. Olympiæ).

Berberis vulgaris (cultæ).

Papaver Rhœas, P. lævigatum, P. hybridum, P. Argemone, Glaucium luteum, Hypecoum grandiflorum.

Fumaria officinalis, F. parviflora, F. micrantha, F. anatolica *Boiss.*, F. capreolata, F. Thureti *Boiss.*, F. macrocarpa *Parl.*

Matthiola tricuspidata (litt. marit.), Cardamine hirsuta, Pteroneuron græcum (reg. mont.), Arabis verna, Nasturtium officinale, Alyssum umbellatum, A. campestre, Erophila præcox, Glypeola Jonthlaspi, Biscutella Columnæ *Ten. forma* androcarpa *Mihi* (siliculis scabris), Thlaspi perfoliatum, Teesdalia Lepidium, Cakile maritima, Conringia orientalis, Stenophragma Thalianum *Celak.*, Sisymbrium Columnæ *Jacq.*, S. officinale, S. polyceratium, Malcolmia flexuosa, M. græca *Boiss. et Sch.* β . integrifolia *Boiss.*, Capsella Bursa-pastoris, Lepidium spinosum, L. Draba, L. graminifolium, Neslia paniculata, Diplotaxis viminea (typica), D. vim. integrifolia *Boiss.*, Hirschfeldia adpressa, Sinapis arvensis, S. arv. *var.* orientalis (pro Anatolia nova), Calepina Corvini, Rapis-trum rugosum, Raphanistrum segetum *Rchb. form.* flaviflora, Bunias Erucago, Senebiera Coronopus.

Capparis spinosa *var.* canescens *Coss.* (= C. spinosa *Fl. Gr.*).

Reseda Luteola.

Fumana arabica, Cistus villosus *var.* creticus *Boiss.*, C. salvifolius, Helianthemum guttatum.

Viola odorata *var.* genuina *Boiss.*

Polygala monspeliaca.

Velezia rigida V. quadridentata, Tunica velutina, Vaccaria grandiflora, Silene Behen, S. cretica, S. gallica, S. bipartita, S. italica, Githago segetum, Arenaria serpyllifolia (mont.), Stellaria media, S. media apetala *Boiss.*, Cerastium viscosum, Spergularia salina, S. media (\odot vel φ), S. marginata *DC.* (littor.).

Polycarpon tetraphyllum, Herniaria hirta (C. in Mistigna, Kentrino, etc.).

Frankenia hispida *DC.*, Phytolacca decandra.

Hypericum crispum.

Malva silvestris, M. silv. eriocarpa *Boiss.*, M. neglecta *W.* (M. nicæensis *All.*), M. parviflora, Lavatera punctata, Althæa hirsuta.

Geranium rotundifolium, G. columbinum, G. dissectum, G. molle, G. purpureum, G. modestum *Jord.*, Erodium cicutarium, E. moschatum, E. gruinum, E. Botrys, E. malacoides.

Oxalis corniculata.

Linum corymbosum, L. strictum, L. str. spicatum *Rchb.*, L. angustifolium.

Tribulus terrestris.

Rhamnus Alaternus.

Cardiospermum Halicacabum (cultum).

Æsculus Hippocastanum et rubicunda (cultæ).

Pistacia vera (cult), *P. Terebinthus* (spont. in reg. inf. et sup. nec non culta), *P. Lentiscus*.

Schinus Molle (cult).

Euphorbia Peplis (arenis marit.), *E. Chamæsyce* (typicum), *E. helioscopia*, *E. aleppica*, *E. exigua var. retusa Roth*, *E. ex. var. tricuspidata Koch*, *E. Peplus*, *E. græca Boiss. et Spruner*, *Crozophora tinctoria*, *Mercurialis annua*, *Buxus sempervirens* (cultus).

Echallium Elaterium.

Saxifraga hederacea (ad sepes, truncos, saxa).

Umbilicus intermedius Boiss., *U. horizontalis*, *Sedum pallidum*, *S. neglectum Ten.* (cultum).

Eryngium campestre, *E. creticum*, *E. maritimum*, *Lagœcia cuminoïdes*, *Bupleurum prostratum*, *B. glumaceum*, *B. Odontites*, *Helosciadium nodiflorum*, *Ammi majus*, *A. Visnaga* (vulgo τσιριτία), *Carum ferulæfolium Desf.*, *Fœniculum officinale*, *Ferula communis*, *Tordylium officinale*, *Condylocarpus apulus*, *Daucus involucratus Sibth. et Sm.*, *D. maximus*, *Torilis heterophylla*, *T. nodosa*, *Caucalis daucoides*, *Scandix Pecten-Veneris*, *Smyrnum Olusatrum*, *Bifora testiculata*.

Epilobium tetragonum.

Rubus fruticosus Smith, *Alchemilla arvensis*, *Sarcopoterium spinosum*, *Poterium verrucosum Erhrenb.* (reg. inf. et submont.).

Anagyris foetida, *Lupinus angustifolius*, *Spartium junceum*, *Calycotome villosa*, *Ononis antiquorum*, *O. leiosperma Boiss.*, *O. brevisflora*, *O. reclinata minor Mor.*, *O. pubescens*, *O. mitissima*, *Medicago marina*, *M. scutellata*, *M. orbicularis*, *M. tribuloides*, *M. tuberculata*, *M. Gerardi*, *M. agrestis Ten.*, *M. coronata*, *M. denticulata Willd.*, *M. lappacea Boiss.*, *M. maculata*, *M. minima β. græca P. Cand.*, *M. disciformis*, *M. Lupulina* (reg. mont.), *Trigonella gladiata*, *T. Fœnum-græcum Fl. Gr.*, *T. corniculata*, *Melilotus parviflora*, *M. officinalis*, *Trifolium hirtum*, *T. Cherleri*, *T. lappaceum*, *T. arvense*, *T. stellatum*, *T. angustifolium*, *T. intermedium Guss.*, *T. alexandrium β. phleoides Boiss.*, *T. panormitanum*, *T. leucanthum*, *T. clypeatum*, *T. striatum β. macrodonton Boiss.*, *T. scabrum*, *T. subterraneum*, *T. nidificum Griseb.*, *T. globosum*, *T. pilulare Boiss.*, *T. fragiferum*, *T. resupinatum et var. majus Boiss.*, *T. tomentosum*, *T. spumosum*, *T. glomeratum*, *T. Petrisavii Clem.*, *T. Balansæ Boiss.*, *T. repens*, *T. uniflorum*, *T. speciosum Willd.*, *T. agrarium*, *T. agr. β. sessile Boiss.*, *T. procumbens*, *Bonjeania hirsuta*, *Lotus conimbricensis Brot.*, *L. angustissimus*, *L. ornithopodioides*, *L. edulis*, *Anthyllis Hermannia*, *Physanthyllis tetraphylla Boiss.*, *Hymenocarpus circinatus*, *Psoralea bituminosa*, *Biserrula Pelecinus*, *Securigera Coronilla*, *Ornithopus compressus*, *Scorpiurus subvillosa*, *Coronilla cretica*, *Coronilla parviflora Willd. β. lutea Heldr.*, *Arthrolobium scorpioides*, *Hippocrepis unisiliquosa*, *H. ciliata*, *Onobrychis æquidentata Sibth. et Sm.*, *O. Caput-galli*, *Vicia hybrida*, *V. lutea var. hirta Boiss.*, *V. sativa*, *V. angustifolia*, *V. peregrina*, *Vicia microphylla*, *V. tetrasperma*, *V. pubescens*, *Lathyrus Aphaca*, *L. Pseudoaphaca Boiss.*, *L. setifolius*, *L. sphæricus*, *Cercis Siliquastrum*, *C. Siliqua*.